ПРИБАВЛЕНІЕ

КЪ НИЖЕГОРОДСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ.

№ 50.

ИЗВѢСТІЯ.

1. *Простое средство противъ простуднаго кашля.*

При первомъ появленіи простуднаго кашля, взять: *маковыхъ цвѣтовъ* ползолотника, или *маковыхъ головокъ* десять гранъ, налить стаканомъ кипятку, и настоять въ закрытомъ сосудѣ, въ продолженіе десяти минутъ; послѣ того, жидкость слить, прибавить къ ней для вкусу нѣсколько сахару, и выпивать это количество настоя каждое утро и вечеръ, до совершеннаго прекращенія кашля. Но если кашель перешелъ уже въ хроническое состояніе, то къ маковымъ цвѣтамъ можно прибавить десять гранъ цвѣтовъ *бараньей травы.*

2. *Леченіе цынготной болѣзни внутреннимъ и наружнымъ употребленіемъ пивныхъ дрожжей.*

Особенно рекомендованное средство д-мъ Нейманомъ въ Берлинѣ, испытано д-мъ Финкъ съ отличнымъ успѣхомъ. Онъ приводитъ слѣдующій случай: у одной женщины, отъ роду 35 лѣтъ, крѣпкаго тѣлосложенія, страдавшей нѣсколько разъ чесоткою и другими болѣзнями, по причинѣ распутной ея жизни, оказались въ Ноябрѣ мѣсяцѣ 1838 года, припадки цынготной болѣзни, скоро достигшіе высокой степени: печальное расположеніе духа, блѣдность и опухлость лица, усталость и слабость силъ, боли въ груди и животѣ, также боли въ конечностяхъ, проницающія, по выра-

женію больной, до самыхъ костей, затруднительное дыханіе, дурной запахъ изо рта, опухлость и темносиній цвѣтъ десенъ, выпаденіе зубовъ, багровыя пятна на разныхъ мѣстахъ тѣла а особенно на нижнихъ конечностяхъ, опухоль ногъ. Сильнѣйшія противуцынготныя средства, приличная діета и помѣщеніе больной въ женской больницѣ, оставались безъ успѣха. Финкъ назначилъ больной пивныя дрожжи снаружи въ видѣ примочекъ и внутрь каждые 2 часа по 2 столовыхъ ложки. По истеченіи сутокъ, дальнѣйшее развитіе болѣзни остановилось, а по прошествіи трехъ недѣль, больная, обреченная уже на смерть, совершенно выздоровела. По мнѣнію Финкъ пивныя дрожжи составляютъ настоящее специфическое средство противъ цынготной болѣзни.

(Изъ Таврическихъ Губ. Вѣд.)

3. Вѣрныя средства отъ мокротнаго кашля.

1. Взять 40 капель сырой воды, влить въ оную 40 капель рому и натопить тудаже 40 капель жженаго на свѣчкѣ сахару и тотчасъ все это выпить ложась спать; въ случаѣ надобности можно повторить пріемъ сей, а для взрослыхъ на одинъ пріемъ пропорцію эту можно удвоить. Не было примѣра, чтобы послѣ одного или двухъ пріемовъ продолжался кашель.

2 Взять прованскаго или деревяннаго масла одну не большую рюмку, всыпавъ туда двѣ чайныя ложки мелко истолченаго сахару и смѣшавши какъ можно лучше, выпить вечеромъ ложась спать, а потомъ запить чаемъ или горячимъ настоемъ изъ бузинныхъ цвѣтовъ (Flores Sambuci). — На утро кашель совершенно уничтожится.

(Изъ Воронеж. Губ. Вѣд.)

4. О пріѣхавшихъ и выѣхавшихъ

(съ 29 Ноября по 6 число Декабря 1841 года.)

Прибыли: изъ Коврова — отстав. Статскій Совѣтникъ *Бороздинъ*, изъ С. Петербурга — Коллежскій Совѣтникъ *Нащокинъ*, изъ Плеса — Подполковникъ *Лютеръ*, изъ Макарьева — отс. Подпоручикъ *Львовъ*, изъ Василя — отс. Коллежскій Регистраторъ — *Мельгуновъ*, остановились Кремлевской части; изъ Оренбурга — Подпоручикъ *Брудинскій*, изъ Галича — Подпоручикъ *Скуратовъ*, остановились Рождественской части; изъ Москвы — Карнетъ *Русеневъ*, остановился Макарьевской части.

Выѣхали: въ Ярославль Генералъ-Маіоръ Князь *Голицынъ*, въ Починки — Статскій Совѣтникъ *Бороздинъ*, въ С. Петербургъ — Подполковникъ *Германъ*, въ Москву — Титулярный Совѣтникъ *Сарантевъ* и Подпоручикъ *Брудинскій*, въ Василь — Карнетъ *Русеневъ*.